

Wiederzulassungstabelle für Gemeinschaftseinrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis (Stand: 01.10.2025)



Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Person	Ausschluss Kontaktpersonen	Meldung an GA	Maßnahmen Auch die Maßnahmen aus dem Hygieneplan beachten!
ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	kein Sekret/Rötung mehr vorhanden	Nein	Ja ab 2 Fällen	
Borkenflechte	2-10 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikatherapie bzw. nach Abheilung	Nein	Ja, auch Verdacht	
EHEC	2-10 Tage	nach Genesung und 2 negativen Stuhlproben	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja, auch Verdacht	
Hand-Fuß-Mund	3-10 Tage	nach Genesung (Austrocknung der Bläschen)	Nein	Ja ab 2 Fällen	 begrenzt viruzid plus/ viruzid
Hepatitis A+E	15-50/64 Tage	2 Wo nach Symptombeginn mit hygienischen Auflagen	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja, auch Verdacht	 begrenzt viruzid plus/ viruzid
Influenza (Grippe) RSV Covid	1-2 Tage 2-8 Tage 3-12 Tage	nach Genesung und 24h Fieberfrei	Nein	Ja ab 2 Fällen	 begrenzt viruzid
Keuchhusten (Pertussis)	6-20 Tage	3/5 Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie, ohne Antibiotika 21 T. nach Symptombeginn	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja, auch Verdacht	
Kopfläuse		nach 1. Behandlung	Nein, aber Kontrolle erforderlich!	Ja	Folgebehandlung nach 8-10 Tagen erforderlich!
Krätze (Skabies)	2-6 Wochen Zweitinfektion 1-4 Tage	nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache	Rücksprache mit Gesundheitsamt evtl. Mitbehandlung	Ja auch Verdacht	 Nachkontrolle nach 14 Tagen
Masern	7-21 Tage	Nach ärztlicher Beurteilung, frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlages	Ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist	Ja, auch Verdacht	 begrenzt viruzid
Mumps	12-25 Tage	nach Genesung, frühestens 5 Tage nach Beginn der Erkrankung	Ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist	Ja, auch Verdacht	 begrenzt viruzid
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	nach Genesung	Nein	Ja ab 2 Fällen	
Ringelröteln	7-14 Tage	mit Beginn des Ausschlages	Nein	Ja ab 2 Fällen	 begrenzt viruzid plus/viruzid
Röteln	14-21 Tage	nach Genesung, frühestens 8 Tage nach Beginn des Ausschlages	Ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist	Ja, auch Verdacht	 begrenzt viruzid
Scharlach oder sonstige Streptococcus pyogenes Infektion	1-3 Tage	24h nach Beginn der Antibiotikatherapie und dem Abklingen der Symptome	Nein	Ja, auch Verdacht	
Windpocken (Varizella-Zoster-Virus)	8-28 Tage Ø 14-16 Tage	nach Genesung und vollständiger Verkrustung der Bläschen	Ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist	Ja, auch Verdacht	 begrenzt viruzid
Magen-Darm-Erreger Norovirus Rotavirus Salmonellen Campylobacter unbekannte Erreger	 1-3 Tage 1-3 Tage 1-10 Tage	 Frühestens 48h nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall	 Nein	 Ja ab 2 Fällen	 begrenzt viruzid plus/ viruzid (bei Noro-/Rotaviren) Lebensmittelhygiene beachten!

Seltene meldepflichtige Infektionskrankheiten sind grundsätzlich mit dem Gesundheitsamt abzuklären!

Cholera, Diphtherie, virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Haemophilus Influenzae Typ b Meningitis, Meningokokken, Tuberkulose, durch Orthopockenviren verursachte Krankheiten, Paratyphus, Pest, Poliomyelitis, Shigellose, Typhus abdominalis

per Mail an infektionsschutz@uh-kreis.de oder telefonisch 03601 802306, 03601 802765 oder 03601 802418

	Verstärkte Händehygiene (Wirkspektrum beachten!)		Kontaktoberflächen desinfizierend reinigen (Wirkspektrum!)		Spielzeug desinfizierend reinigen (Wirkspektrum!)		desinfizierendes Waschmittel über 60°		Geschirr in Spülmaschine > 60°
--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	--------------------------------